

AVERTISSEMENTS AGRICOLES TELEIMPRIMES

003 00089 0313A 00 121116 03103

CNEPS
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DEPARTEMENT DES PERIODIQUES
56 RUE DE RICHELIEU

75084 PARIS CEDEX 02

DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 280. RUE DE FOUGERES BP 67128 35067 RENNES CEDEX

EDITION CULTURES LEGUMIERES

BULLETIN N°200

RENNES LE 9 NOVEMBRE 1990

SITUATION DANS LE NORD FINISTERE ARTICHAUT

Poursuite des vols de pucerons verts et noirs. La colonisation des parcelles continue sans atteindre de très hauts niveaux d'infestation. Les adultes d'apions sont toujours présents dans de nombreuses parcelles.

Si ce n'est déjà fait, réalisez impérativement un traitement visant ces 2 parasites en mouillant abondamment pour atteindre les pucerons et les apions cachés au coeur de l'artichaut.

CHOUX

Les attaques de piérides et de noctuelles deviennent faibles. Les attaques de pucerons cendrés régressent du fait de la pression des auxiliaires mais les dégâts peuvent encore être conséquents dans les plantations tardives de chou-fleur.

En cas d'attaques notables de pucerons cendrés sur chou-fleur dans les plantations tardives, réalisez un dernier traitement avec PIRIMOR ou CRONETON par température supérieure à 15 degrés, l'après-midi de préférence.

261